

Batuudid ja teadlik lapsevanem

(Artikkel on avaldatud USA näidete ja uurimuste põhjal)

Lastele meedib batuudil hüpata. Soov lennata õhus ning ennast õhus ümber pöörata ja keerata, uhkus uusi trikke õppida - see kõik on väga lõbus hetkeni, mil keegi haiget saab.

Batuutide tutvustus

Batuudid said populaarseks 1960. aastatel, kui elastset riiet kasutati maapinnal olevate suurte aukude katmiseks. Jumpville Trampoline Center Lõuna-Californias disainis mitu sellist 1960-nendatel. Järgmisena lisati neile jalad või postid, mis aga jätsid suured ohtlikud vahed servade ümber ja mitte miski ei hoidnud hüppajat sealt kukkumast. Nüüdisaegsed batuudid peaksid olema turvalisemad, kuna need on ümbritsetud võrkudega. Sellele vaatamata ei lahenda see probleemi vedrude juures olevate vahede suhtes ega ka siis, kui batuudil on rohkem kui üks laps korraga. Ajalugu näitab, et ainuke turvaline viis lapsele, on teda mitte batuudile lasta.

Traumade ajalugu

Ameerika Lastearstide Akadeemia on avaldanud hoiatused 1977, 1981 ja 1999. aastal, et esile tõsta batuutide ohtusid. Nad ei soovita neid kasutada kodus ega ka kehalise kasvatuse tundides koolis. Kuid neile hoiatustele vaatamata on erakorralise meditsiiniabi osakonna külastused aastatel 1990-2005 taevani küündinud.

1998. aastal Science Daily's ilmunud artikli kohaselt oli 1990-1995 aastatel EMO-s batuudiga seotud traumade puhul antud esmaabi 250 000 juhul ning aastane õnnetuste arv oli kasvanud 29600-lt kuni 58400-ni.

Journal of Bone and Joint Surgery avaldas 1998, et 43% kõigist õnnetustest juhtus lastega vanuses 5-9 eluaastat ja 28% vanuses 10-14. Kõige kurvem aga on see, et 15% õnnetustest juhtus lastega vanuses alla 4. eluaasta. See näitab selgelt, et enamus traumasid toimub alla 14 aastaste lastega.

Pediatric Neurosurgery ilmunud artikkel 2000 aastal kirjutab, et batuudi tõttu toimunud laste selgroo vigastuste arv oli 1998. aastal üle 6500. Consumer Product Safety Commission (CPSC) arvestuste kohaselt oli 2001. aastal 91870 EMO külastust, mis olid seotud batuudil toimunud õnnetustega. Haiget saanutest oli 93% alla 15. eluaasta ning 11% olid alla 5 aastased lapsed. CPSC on väitnud oma edasistes avaldustes, et alates 1990. aastast on olnud 11 surmajuhtumit, millest kuuel korral on tegu olnud lastega alla 15. eluaasta.

Hiljutine statistika

2004. aasta tarbijaaruande poolt välja antud uuringute kohaselt vajas 2003. aastal EMO-s abi batuudi õnnetuste tõttu 98000 inimest, kellest üle 50000 olid lapsed. Ameerika Lastearstide Akadeemia avaldas hiljuti uuringu tulemused, mis koostati 2007. aastal National Electronic Injury Surveillance System (NEISS) andmetel. Uuring põhineb 2000-2005 aasta andmetel, et hinnata lastega batuudil toimunud õnnetusi ning võrrelda neid andmeid aastatega 1990-1995. Tulemused näitasid, et aastatel 1990-1995 oli EMO visiitide arv batuudil toimunud õnnetuste puhul aastas 41600 ja aastatel 2000-2005 88563, ehk 133% rohkem.

Uuringu autorid usuvad, et rohkem tuleks teha ära just avalikkuse harimises, et selgitada ohtusid, mis kaasnevad batuutide kasutamisega kodus. Samuti väidavad nad, et tuleks kasutusele võtta ekstreemsed abinõud, et lapsevanemad lõpetaksid asjade ostmise, mis on tõestatud ohtlikena.

Kas batuudid peaksid olema keelustatud?

Uuringud näitavad, et avalikkuse teavitamine batuudiga seotud riskidest ei ole aidanud vähendada traumade arvu. Tegelikkus on hoopis vastupidine – vigastuste arv suureneb astmeliselt igal aastal.